


Melo

Impianti in produzione - Agricoltura Convenzionale



PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione culturale</i>
Rigonfiamento gemme	1 Fogliare		Per contrastare i danni da stress ossidativi e migliorare il benessere della pianta: • MINUS Rame 5 kg/ha (500 g/hl)
	1 Concimazione di base	Concime organico o organo-minerale	Orgazot Plus (Micro)* 150-200 kg/ha * ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL
Da mazzetti affioranti a inizio fioritura	1 Fertirrigazione	RED Radicale 10 kg/ha + MAIOR 0-42-50 10 kg/ha	Per favorire ulteriormente lo sviluppo vegetativo: + BLU 10 kg/ha
Da fioritura a caduta petali	1 Fogliare	MAIOR PLUS 3 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha	
	1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata		In caso di rischio gelate: • ICE TIME 5-6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
Da caduta petali a mela con diametro di 10-15 mm	1 Fertirrigazione		Per fornire ulteriori energie alla pianta e aumentare la pezzatura: • RED Radicale 10 kg/ha + MAIOR 0-42-50 10 kg/ha + BLU 10 kg/ha
	1 Fogliare	MAIOR PLUS 2 kg/ha + MINUS Calcio 3 kg/ha	
	1 Fogliare Dopo 10-15 giorni	RELIFE 1 kg/ha	Per trattare le carenze di ferro: + MINUS Ferro 2-3 kg/ha
	1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata		In caso di rischio gelate • ICE TIME 5-6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
Ingrossamento frutti fino a metà giugno	1 Fertirrigazione	RED Radicale 10 kg/ha + MAIOR 0-42-50 10 kg/ha + BLU 10 kg/ha	
	3 Fogliari A distanza di 10-15 giorni	A. RELIFE 1 kg/ha + MINUS Calcio 3 kg/ha B. MAIOR PLUS 3 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha C. RED 3 kg/ha + MAIOR PLUS 3 kg/ha + MINUS Calcio 3 kg/ha	Per trattare le carenze di ferro, aggiungere all'applicazione B : + MINUS Ferro 3 kg/ha
Ingrossamento frutti da metà giugno fino a raccolta	Fogliari Ogni 15-20 giorni		Per contrastare i danni da siccità e caldo anomalo: • RED 3 kg/ha Per ispessire la buccia e aumentare la conservazione del frutto: • MINUS Calcio 3 kg/ha
Dopo la raccolta	1 Fogliare	MINUS Rame 4 kg/ha	Per trattare le carenze di zinco e contrastare i danni da stress ossidativo: + MINUS Zinco 2 kg/ha
Periodo invernale	1-3 Fogliari		Per contrastare i danni da stress ossidativo: • MINUS Rame 5 kg/ha Da applicare nelle giornate invernali più calde (oltre i 12-13 °C)