

CONCIMAZIONE FOGLIARE DEL FAGIOLINO DA INDUSTRIA

RELIFE

RELIFE è un concime organico consentito in agricoltura biologica studiato in modo specifico per l'applicazione fogliare.

RELIFE è particolarmente efficace nel promuovere le numerose funzioni fisiologiche della pianta e nel favorire lo sviluppo delle radici. Le piante trattate con **RELIFE**, grazie all'incremento dell'efficienza dell'apparato radicale, assorbono con maggiore facilità acqua ed elementi nutritivi e, di conseguenza, sono più sane e più produttive. L'incremento di produttività, nella media, è pari al 15%.

RED

RED è un fertilizzante organico consentito in agricoltura biologica studiato in modo specifico per l'applicazione fogliare.

RED è particolarmente efficace nell'aiutare le piante a tollerare meglio le alte temperature e a resistere durante le fasi di siccità.

Una pianta trattata con **RED** tollerando meglio il caldo e trattenendo le risorse idriche al suo interno le permette di espletare meglio tutte le sue funzioni fisiologiche



Nella coltura del fagiolino, ai fini di ottenere una elevata produttività, è molto importante disporre di un apparato radicale efficiente. L'apparato radicale efficiente è molto importante soprattutto perché permette alla pianta di assimilare in modo più efficace gli elementi nutritivi necessari alla produzione (azoto e fosforo in particolare). A tale scopo si suggerisce di effettuare una applicazione fogliare con **RELIFE** alla dose di 1 kg/ha in concomitanza con altri trattamenti (fertilizzanti, fungicidi, insetticidi) nel periodo compreso fra la presenza di 4 foglie vere e la fioritura.

In caso di stagione molto calda durante il periodo della fioritura e dell'allegagione, può succedere che il fagiolino abbia problemi di allegagione e che, di conseguenza, accada che la produttività della coltura risulti più scarsa delle attese. Per far fronte a questo problema, si suggerisce di effettuare una applicazione fogliare di **RED** alla dose di 3 kg/ha. Il **RED** va applicato in previsione o in concomitanza di temperature elevate, possibilmente prima della fioritura o durante la fioritura/allegagione.

DOSI DI APPLICAZIONE

- **RELIFE** 1 kg/ha per applicazione fogliare nel periodo compreso fra 4 foglie vere e la fioritura
- In caso di caldo eccessivo, **RED** 3 kg/ha per applicazione fogliare prima o durante la fioritura/allegagione