

# Vite

## Nuovi impianti - Agricoltura Convenzionale



### PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione culturale</i>
Trapianto	Concimazione di base	Concime organico o organo-minerale	<b>ORGAZOT Plus*</b> 30-50 g/pianta mescolato al terreno sulla fila prima del trapianto, oppure distribuito localizzato sulla fila, dopo il trapianto  * <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è il concime organico granulare consigliato da <b>GERMINA</b> per la concimazione solida di base. <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è prodotto da <b>AGM SRL</b>
	1 Fertirrigazione	<b>RED Radicale</b> 5 g/pianta	
	1 Fertirrigazione	<b>RED Radicale</b> 5 g/pianta a + <b>MAIOR 0-42-50</b> 5 g/pianta kg/ha	Per favorire un migliore sviluppo delle piante: • <b>BLU</b> 5-7 g/pianta kg/ha
A partire da germogli lunghi 5-10 cm	<b>Fogliari</b> Ogni 10-15 giorni fino a inizio estate		Per contrastare le carenze e aumentare la resistenza agli stress ossidativi: • <b>MINUS Rame</b> 300-500 g/hl (3-5 kg/ha)  In 1-2 applicazioni, si consiglia di aggiungere: • <b>MINUS ZINCO</b> 200 g/hl (2 kg/ha)  <b>Ripetere</b> l'applicazione ogni 10-15 giorni circa fino a inizio estate
	1 o più <b>Fogliari</b>	<b>MAIOR PLUS</b> 300 g/hl (3 kg/ha) + <b>RELIFE</b> 100 g/hl (1 kg/ha)	Si consiglia di ripetere l'applicazione dopo circa 20-30 giorni
Estate	<b>Fogliari</b> Ogni 20 giorni circa		Per ridurre gli stress da caldo e siccità • <b>RED</b> 300 g/hl (3 kg/ha)