

RED Fogliare

CONTRO STRESS DA CALDO E SICCITÀ



PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA | UMATI SOLUBILI DA LEONARDITE (ACIDI UMICI E FULVICI) - Carbonio (C) organico solubile in acqua 3,1%; Carbonio (C) organico umificato 3,0%; Azoto (N) organico sulla sostanza secca 1,0% - **Mezzo estraente:** soluzione acquosa di idrossido di potassio (KOH). **Componenti:** leonardite.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

- **ESTRATTO UMICO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE FOGLIARE**
- **INCREMENTA LA RESISTENZA DELLE PIANTE ALLE ELEVATE TEMPERATURE**
- **INCREMENTA LA RESISTENZA DELLE PIANTE ALLA SICCITÀ**

- **MIGLIORA LA QUALITÀ DELL'ALLEGAGIONE E RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI**
- **INCREMENTA L'EFFICACIA DEI FERTILIZZANTI FOGLIARI AD ESSO ABBINATI**
- **RIDUCE IN MODO SENSIBILE I DANNI PROVOCATI DA PRODOTTI A BASE DI AGROFARMACI E DA SOSTANZE FITOTOSSICHE**

- **CONTRASTA FISIOPATIE TIPO "BRUSONE";**
- **MIGLIORA IL LIVELLO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE, (COLORE DEI FRUTTI, DELL'UVA, SAPORE, ACIDITÀ, GRADO CONTENUTI ANTIOSSIDANTI, ANTOCIANI E POLIFENOLI**

Caratteristiche e modalità d'uso

RED Fogliare è composto da molecole organiche di origine naturale (acidi umici e fulvici) facilmente assimilabili dalle foglie. Come per tutti i fertilizzanti per applicazione fogliare, il modo migliore per impiegare il prodotto è irrorare tutta la superficie fogliare evitando lo sgocciolamento. La quantità di acqua idonea per l'applicazione, in funzione della coltura e del sistema di irrigazione, è pari a 300-1500 litri di acqua/ha.

Caratteristiche principali

- **ESTRATTO UMICO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE FOGLIARE** - **RED Fogliare** è un prodotto a base di acidi umici e fulvici specifico per applicazione fogliare.
- **INCREMENTA LA RESISTENZA DELLE PIANTE ALLE ELEVATE TEMPERATURE** - Gli acidi umici e fulvici che contiene **RED Fogliare** aiutano le foglie a mantenere la corretta idratazione per sopportare meglio sbalzi termici o temperature elevate.
- **INCREMENTA LA RESISTENZA DELLE PIANTE ALLA SICCITÀ** - Gli acidi umici e fulvici di **RED Fogliare** diminuiscono la traspirazione dell'acqua dalle foglie, mantenendo però aperti gli stomi. In questo modo la pianta resiste maggiormente ai periodi di siccità, senza perdere efficacia della fotosintesi.
- **RIDUCE IN MODO SENSIBILE I DANNI PROVOCATI DA PRODOTTI A BASE DI AGROFARMACI E DA SOSTANZE FITOTOSSICHE** - Diversi composti utilizzati per via fogliare possono creare problemi di fitotossicità (es. insetticidi, fungicidi, concimi a base di chelati, di nitrati o prodotti a base di rame). L'impiego di **RED Fogliare** abbinato a questi prodotti ne riduce la possibile fitotossicità senza ridurne l'efficacia, permettendo quindi di poter effettuare le diverse operazioni agronomiche con maggior tranquillità.
- **INCREMENTA L'EFFICACIA DEI FERTILIZZANTI FOGLIARI AD ESSO ABBINATI**: Non tutti i concimi fogliari vengono assorbiti con facilità a causa di vari fattori. **RED Fogliare** contiene composti in grado di superare molte delle barriere che ostacolano l'assorbimento di un fertilizzante; pertanto, se abbinato ad altri concimi fogliari, ne incrementa l'assimilabilità;
- **MIGLIORA IL LIVELLO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE**: Parametri qualitativi quali colore (es. colore dei frutti, colore nell'uva), sapore, parametri analitici qualitativi in genere (acidità, grado, contenuto in antiossidanti, antocianine e polifenoli, ecc.) vengono migliorati dall'impiego di **RED Fogliare** soprattutto se questo viene utilizzato anche durante la fase estiva;
- **CONTRASTA FISIOPATIE TIPO "BRUSONE";**
- **MIGLIORA LA QUALITÀ DELL'ALLEGAGIONE E RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI.**
- **CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**: Consentito in agricoltura biologica (N° di registro SIAN 0043360/24).

Miscibilità

Miscibilità con agrofarmaci: Il prodotto è miscibile con agrofarmaci, compresi quelli a base di rame, zolfo, fosfati e fosfetil, dodina e fosorganici. Quando si effettua la miscela con un agrofarmaco, è consigliabile aggiungere anche **RED Fogliare** in ragione di 2-3 kg/ha (200-300 g/100 litri). Occorre sempre fare attenzione nel miscelare prodotti diversi ed assicurarsi della compatibilità chimica.

Miscibilità con fertilizzanti: È possibile verificare i concimi compatibili consultando l'apposita sezione del catalogo prodotti e il [sito web](#).

Per informazioni più dettagliate si raccomanda di contattare il servizio tecnico **GERMINA** facendo riferimento al proprio fornitore.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Sostanza organica	6,2%
Sostanza organica solubile in acqua	6,2%
Acidi umici e fulvici	6,0%
Carbonio (C) organico	3,1%
Carbonio (C) organico solubile in acqua	3,1%
Carbonio (C) organico umificato	3,0%
Grado di umificazione	96,8%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca	1,0%
pH prodotto tal quale (Valore misurato al momento del confezionamento. Il valore di pH può modificarsi nel tempo)	9,5
pH prodotto diluito in acqua (1g/litro) (Valore misurato al momento del confezionamento)	7,7
Conducibilità elettrica (EC) prodotto diluito in acqua (1g/litro)	0,025 mS/cm

Il prodotto NON contiene fosfati o fosfonati

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Stoccaggio e Avvertenze

CONSERVARE IL PRODOTTO SIGILLATO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE ORIGINALE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, EVITANDO DI ESPORLO AI RAGGI SOLARI.

PRODOTTO A REAZIONE ALCALINA. MANEGGIARE CON CURA. IN CASO DI FUORIUSCITA DEL PRODOTTO LAVARE CON ACQUA.



Prodotto liquido in Formati da 1 kg, 5 kg e 20 kg

RED Fogliare

CONTRO STRESS DA CALDO E SICCITÀ



NON SUPERARE LE DOSI INDICATE. IN CASO DI DUBBI SUI DOSAGGI CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE. AGITARE ADEGUATAMENTE IL CONTENITORE PRIMA DELL'USO. VERIFICARE LE POSSIBILI MISCELE SUL SITO WEB GERMINA. NEL CASO DI DUBBI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO GERMINA FACENDO RIFERIMENTO AL PROPRIO FORNITORE.

Dosi di applicazione fogliare

Colture	Dichiarazioni	Fase di applicazione	Dose	N° di applicazioni
Melo, Pero e Pomacee in genere	Per migliorare qualità della produzione, lo stato di benessere della pianta; Contrastare il "brusone"; Ridurre i danni da agrofarmaci e sostanze fitotossiche; Incrementare la resistenza alle elevate temperature.	In Fioritura /allegagione	1 - 2 kg/ha	Da 1 a 2 applicazioni
	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo e favorire la formazione di colore nei frutti	Da allegagione a ingrossamento frutto	1,5 - 3 kg/ha	Ogni 15 - 20 giorni
		Periodo estivo	2,5 - 3 kg/ha	Ogni 15 - 20 giorni
		In caso di forte caldo e bassa escursione termica giorno/notte	2,5 - 3 kg/ha	Ogni 10 - 15 giorni
Albicocco, Ciliegio	Per migliorare qualità della produzione, lo stato di benessere della pianta; Contrastare il "brusone"; Ridurre i danni da agrofarmaci e sostanze fitotossiche; Incrementare la resistenza alle elevate temperature.	Da Fioritura ad allegagione	1 - 2 kg/ha	Da 1 a 2 applicazioni
		Da fioritura ad allegagione, in caso di giornate molto calde	2 - 3 kg/ha	
		Da allegagione a raccolta frutti	2 - 3 kg/ha	Ogni 15 - 20 giorni
Pesco, Susino e Drupacee in genere	Per migliorare qualità della produzione, lo stato di benessere della pianta; Ridurre i danni da agrofarmaci e sostanze fitotossiche; Incrementare la resistenza alle elevate temperature.	Da Fioritura ad allegagione	1 - 2 kg/ha	Da 1 a 2 applicazioni
		Da fioritura ad allegagione, in caso di giornate molto calde	2 - 3 kg/ha	
		Da allegagione a ingrossamento frutto	1,5 - 3 kg/ha	Ogni 15 - 20 giorni
	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo	Periodo estivo	2,5 - 3 kg/ha	Ogni 15 - 20 giorni
Ulivo	Per mantenere bassa l'acidità dell'olio e per ridurre la cascola delle olive nel periodo caldo e siccitoso	Da dopo allegagione a raccolta	3-4 kg/ha	Da 2 a 4 applicazioni, ogni 20 - 30 giorni
Actinidia (Kiwi)	Per favorire la qualità dell'allegagione	Fioritura	1,5 - 2 kg/ha	Da 1 a 2 applicazioni a distanza di 5-10 giorni
	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo	Fase di accrescimento del frutto	2 - 3 kg/ha	Da 1 a 3 applicazioni
Nocciolo, Castagno, Noce e Mandorlo	Per contrastare i danni da caldo	Periodo estivo	2,5 - 3 kg/ha	Ogni 15 - 20 giorni
		In caso di forte caldo e bassa escursione termica giorno/notte	2,5 - 3 kg/ha	Ogni 10 - 15 giorni
Altre colture frutticole	Per favorire la qualità dell'allegagione	Fioritura	1 - 2 kg/ha	Da 1 a 2 applicazioni
	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo	Periodo estivo	2 - 3 kg/ha	Ogni 15 - 20 giorni
Vigneti (uva da vino)	Per favorire una buona allegagione	Prima della fioritura	1,5 - 2,5 kg/ha	1 applicazione
	Per migliorare i parametri qualitativi dell'uva (acidità, colore, contenuto in antociani e polifenoli)	Da inizio invaiatura in poi	2 - 3 kg/ha	Da 1 a 3 applicazioni a distanza di 15 - 20 giorni
Vigneti (uva da tavola)	Per favorire una buona allegagione	Prima della fioritura	2 - 3 kg/ha	1 applicazione
		In fioritura	2 - 3 kg/ha	1 applicazione
Orticolare da frutto in serra	Per favorire uno sviluppo equilibrato del grappolo, soprattutto se in presenza di elevate temperature	Da fioritura a raccolta frutti	3 kg/ha	Ogni 20 giorni
	Per ridurre i problemi da eccesso di calore e per migliorare la qualità dei frutti (colore, sapore, ecc.)	A partire dalle prime foglie vere fino a raccolta frutti	200 - 300 g/100 litri	Ogni 20 giorni
Orticolare da frutto in pieno campo	Per migliorare la qualità dei frutti (colore, sapore, ecc.), soprattutto durante il periodo estivo	Fino a raccolta frutti	200 - 300 g/100 litri	Da 2 a 3 applicazioni, ogni 20 giorni
Pomodoro da industria in campo	Per contrastare i danni da caldo	Periodo estivo	2,5 - 3 kg/ha	Ogni 10 - 20 giorni
Orticolare da foglia in serra e in pieno campo	Per favorire l'attecchimento delle piantine e per ridurre lo stress da trapianto, soprattutto se in presenza di giornate assolute	Subito dopo il trapianto	200 - 300 g/100 litri	1 applicazione
	Per le colture da seme	A partire dalle prime foglie vere	200 g/100 litri	1 applicazione
	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo	Durante lo sviluppo della coltura	200 - 300 g/100 litri	Da 1 a 2 applicazioni a distanza di 15 - 20 giorni
Orticolare in vivaio	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo	A partire dalle prime foglie vere	300 g/100 litri	Da 1 a 2 applicazioni ogni 20 giorni
Piccoli frutti (Fragola, Lampone, Mirtillo e Mora)	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo	Periodo estivo	2 - 3 kg/ha	Ogni 7-20 giorni
Aromatiche in vaso	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo	Periodo estivo	200 - 300 g/100 litri	Da 1 a 3 applicazioni ogni 20 - 30 giorni
Aromatiche in pieno campo	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo	Periodo estivo	200 - 300 g/100 litri	Da 2 a 3 applicazioni ogni 20 - 30 giorni
Floricole	Per aiutare la pianta a sopportare lo stress da caldo	Periodo estivo	200 - 300 g/100 litri	Ogni 20 giorni circa