

# Ulivo

Impianti in produzione - Agricoltura Convenzionale



## PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i>
Risveglio vegetativo	1 Concimazione di base	Concime organico o organo-minerale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Orgazot Plus (Micro)*</b> 80-100 kg/ha</li> </ul> <p>* <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è il concime organico granulare consigliato da <b>GERMINA</b> per la concimazione solida di base. <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è prodotto da AGM SRL</p>
	1 Fertirrigazione	<b>RED Radicale</b> 50 g/pianta o 15 kg/ha + <b>BLU</b> 50-70 g/pianta o 15-20 kg/ha + <b>MAIOR 0-42-50</b> 20-30 g/pianta o 6-10 kg/ha	
	1 Fogliare	<b>MINUS Rame</b> 5 kg/ha	
Circa 10-15 giorni prima della fioritura	1 Fogliare	<b>MAIOR PLUS</b> 3 kg/ha + <b>RELIFE</b> 1,5 kg/ha	
Fioritura	1 Fertirrigazione		Per fornire ulteriori energie alla pianta e migliorare l'assorbimento radicale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RED Radicale</b> 30 g/pianta o 10 kg/ha + <b>MAIOR 0-42-50</b> 30 g/pianta o 10 kg/ha + <b>BLU</b> 30 g/pianta o 10 kg/ha</li> </ul>
	1 Fogliare	<b>MAIOR PLUS</b> 3 kg/ha + <b>RELIFE</b> 1 kg/ha	+ <b>BETTER</b> 1 kg/ha per favorire l'allegagione
Da allegagione a raccolta	1 Fogliare	<b>RED</b> 3 kg/ha + <b>MINUS Calcio</b> 3 kg/ha	
	<b>Fogliari</b> Da ripetere ogni 20 giorni fino a raccolta		Per contrastare i danni da siccità e caldo anomalo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RED</b> 3 kg/ha</li> </ul> Per fornire calcio al frutto, aumentarne i profumi e migliorarne la conservazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MINUS Calcio</b> 3 kg/ha</li> </ul>
Post-raccolta	1 Fogliare	<b>MINUS Rame</b> 3 kg/ha + <b>MINUS Zinco</b> 2 kg/ha	
Durante l'inverno	<b>Fogliari</b> 2 o 3 applicazioni al massimo		<b>MINUS Rame</b> 5 kg/ha in giornate particolarmente calde nel periodo invernale (da 12-13 °C), per contrastare i danni da stress ossidativo