

# Piante aromatiche in vaso

Agricoltura Biologica



## PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i>
Dopo il trapianto	2 <b>Fertirrigazioni</b> a distanza di 10-15 giorni	<b>ECORED Radicale</b> 1 kg/1000 litri	Per migliorare l'efficacia di prodotti a base di <b>microrganismi</b> (micorrize, batteri, ecc.) si consiglia di applicarli in miscela con <b>ECORED Radicale</b>
	1 <b>Fogliare</b> da ripetere se necessario dopo 10-15 giorni	<b>MAIOR NOVA</b> 300 g/hl+ <b>RELIFE</b> 100 g/hl	Per aumentare la durezza dei germogli e contrastare le filature: + <b>MINUS Calcio</b> 300 g/hl;  In caso di temperature elevate: + <b>ECORED</b> 300 g/hl
	<b>Fogliari</b> ogni 20 giorni circa		Per migliorare lo stato di benessere delle piante e per ridurre i problemi da stress (caldo, siccità, potatura, ecc.): • <b>MINUS Rame</b> 300g/hl + <b>MINUS Zinco</b> 200 g/hl
Sviluppo vegetativo	<b>Fertirrigazioni</b> ogni 7-10 giorni fino a fine sviluppo vegetativo	<b>BLU</b> 2 kg/1000 litri	In caso di periodo piovoso: + <b>MINUS Calcio</b> 1 kg/1000 litri 1 volta al mese;
	1 <b>Fertirrigazione</b>		In caso di giallume fogliare: • <b>MINUS Ferro</b> 1 kg/1000 litri + <b>MINUS Zinco</b> 0,5 kg/1000 litri;  Per accelerare la crescita delle piante: • <b>ECORED Radicale</b> alla dose di 2 kg/1000 litri; da ripetere dopo 10-15 giorni se necessario
	<b>Fogliari</b> da alternare ogni 10-15 giorni Ripetere sequenza fino a fine sviluppo vegetativo.	A. <b>MINUS Calcio</b> 300 g/hl + <b>MAIOR NOVA</b> 300 g/hl	In caso di temperature elevate: + <b>ECORED</b> 300 g/hl
		B. <b>MINUS Ferro</b> 300 g/hl + <b>RELIFE</b> 100 g/hl	In caso di temperature elevate: + <b>ECORED</b> 300 g/hl
	C. <b>MINUS Rame</b> 300 g/hl + <b>MINUS Zinco</b> 200 g/hl  <i>Dopo 10-15 giorni dall'intervento C ricominciare sequenza dall'intervento A.</i>		
Mantenimento piante	<b>Fertirrigazioni</b> Ogni 7 giorni circa	<b>BLU</b> 1 kg/1000 litri	Nel caso in cui non si possa fare la fertirrigazione ogni 7 giorni (es.: periodo piovoso), raddoppiare la dose di <b>BLU</b> e applicarlo ogni 15 giorni  In caso di periodo piovoso alternare le seguenti due applicazioni (massimo 1 volta al mese):  + <b>MINUS Calcio</b> 1 kg/1000 litri  + <b>MINUS Rame</b> 500 g/1000 litri + <b>MINUS Zinco</b> 500 g/1000 litri
	<b>Fogliari</b> da alternare ogni 10-15 giorni Ripetere sequenza fino a fine sviluppo vegetativo.	A. <b>MINUS Calcio</b> 300 g/hl + <b>MAIOR NOVA</b> 300 g/hl	In caso di temperature elevate: + <b>ECORED</b> 300 g/hl
		B. <b>MINUS Ferro</b> 300 g/hl + <b>RELIFE</b> 100 g/hl	In caso di temperature elevate: + <b>ECORED</b> 300 g/hl
		C. <b>MINUS Rame</b> 300 g/hl + <b>MINUS Zinco</b> 200 g/hl  <i>Dopo 10-15 giorni dall'intervento C ricominciare sequenza dall'intervento A.</i>	