

# Actinidia - Kiwi

Nuovi Impianti (1° anno) - Agricoltura Convenzionale



## PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i>
Prima del trapianto	1 <b>Concimazione di base</b>	Concime organico o organo-minerale	<p><b>Orgazot Plus (Micro)*</b> 80-100 g/pianta distribuendo il prodotto nella buca e mescolandolo al terreno. Non mettere il prodotto a contatto della radice.</p> <p>* <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è il concime organico granulare consigliato da <b>GERMINA</b> per la concimazione solida di base. <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è prodotto da <b>AGM SRL</b></p>
Dopo il trapianto	2 <b>Fertirrigazioni</b> (localizzato)	<b>RED Radicale</b> 10 g/pianta (da ripetere dopo 20-30 giorni)	Se si utilizzano prodotti a base di microrganismi (micorrize, batteri, ecc.), al fine di aumentarne l'efficacia, si consiglia di miscelarli con <b>RED Radicale</b>
Apertura foglie	1 <b>Fertirrigazione</b>		<p>Per favorire un ottimale sviluppo dell'apparato radicale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BLU</b> 20 g/pianta + <b>RED Radicale</b> 10 g/pianta (1 <b>fertirrigazione</b>)</li> </ul> <p>Se si utilizzano prodotti a base di microrganismi (micorrize, batteri, ecc.), al fine di aumentarne l'efficacia, miscelare con <b>RED Radicale</b></p>
	1 <b>Fogliare</b>	<b>MINUS RAME</b> 300 g + <b>MINUS ZINCO</b> 200 g/100 litri	
A partire da foglie aperte e per tutta la stagione vegetativa	<b>Fogliari</b> da alternare ogni 20-30 giorni Ripetere sequenza fino a fine sviluppo vegetativo.	A. <b>MAIOR PLUS</b> 300 g/100 litri + <b>RED</b> 300 g/100 litri	
		20-30 giorni dopo l'intervento <b>A</b> : B. <b>RELIFE</b> 150 g/100 litri	In caso di specie soggette a carenze da ferro, soprattutto se coltivate in suoli calcarei o con poca sostanza organica, + <b>MINUS FERRO</b> 300 g/100 litri
		20-30 giorni dopo l'intervento <b>B</b> : C. <b>MINUS RAME</b> 300-400 g/100 litri Dopo 20-30 giorni dall'intervento <b>C</b> ricominciare sequenza dall'intervento <b>A</b> .	In terreni poveri di zinco disponibile (di solito i terreni poveri di zinco sono quelli calcarei con poca sostanza organica) + <b>MINUS Zinco</b> 100-200 g/100 litri
Caduta foglie	1 <b>Fogliare</b>		<p>Per il benessere della pianta e per aiutarla in caso di stress (es Freddo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MINUS RAME</b> a 500 g/100 litri (1 <b>fogliare</b>)</li> </ul>
Periodo invernale	1 <b>Fogliare</b>	<b>MINUS Rame</b> 500 g/100 litri	<p>Per il benessere della pianta e per aiutarla in caso di stress (es gelate primaverili)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ulteriori 1-2 applicazioni di <b>MINUS RAME</b> a 500 g/100 litri prediligendo le giornate più miti</li> </ul>