


Anguria e Melone

Agricoltura convenzionale



PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i>
In fase di preparazione terreno	Concimazione di base	Concime organico o organo-minerale	ORGAZOT Plus (Micro)* 150-200 kg/ha (interrare leggermente dopo la distribuzione) * ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL
Subito dopo il trapianto	1 Fertirrigazione	RED Radicale 10 kg/ha + MAIOR 0-42-50 8-10 kg/ha	Per stimolare ulteriormente lo sviluppo vegetativo: + BLU 10 kg/ha
	1 Fogliare	RELIFE 100 g/hl (1 kg/ha) + MAIOR PLUS 300 g/hl (3kg/ha)	Per migliorare ulteriormente lo stato di salute della pianta e aumentare l'immagazzinamento di energie per il successivo ingrossamento dei frutti: • Ripetere il trattamento dopo circa 7 giorni
A partire da 15 giorni dopo il trapianto fino a formazione primi frutti	1 Fogliare	MINUS Rame 300 g/hl (3 kg/ha) + MINUS Zinco 200 g/hl (2 kg/ha)	
	1 Fogliare 10-15 giorni dopo	RELIFE 100 g/hl (1 kg/ha) + MAIOR PLUS 300 g/hl (3 kg/ha)	Per trattare le carenze di ferro: + MINUS Ferro 300 g/hl (3 kg/ha)
	1 Fogliare 10-15 giorni dopo		Per contrastare le carenze di zinco e aiutare la pianta a contrastare gli stress ossidativi: • MINUS Rame 300 g/hl (3 kg/ha) + MINUS Zinco 200 g/hl (2 kg/ha)
	1 o più Fogliari A distanzi di 10-15 giorni		Per contrastare i danni da siccità e caldo anomalo: • RED 300 g/hl (3 kg/ha)
A partire dalla formazione dei frutti	2 o 3 Fertirrigazioni a distanza di 10-15 giorni	1. MAIOR 0-42-50 5 kg/ha + RED Radicale 5 kg/ha 2. BLU 30 kg/ha	
	Fertirrigazione ulteriore a distanza di 10-15 giorni dalle precedenti		Per sviluppare ulteriormente l'apparato radicale, migliorare l'assorbimento dei nutrienti e nutrire la pianta: • MAIOR 0-42-50 5 kg/ha + RED Radicale 5 kg/ha
	1 Fogliare	RED 300 g/hl (3 kg/ha) + MAIOR PLUS 300 g/hl (3 kg/ha) + MINUS CALCIO 400 g/hl (4 kg/ha)	
	Fogliari Da ripetere ogni 15-20 giorni		Per contrastare i danni da siccità e caldo anomalo: • RED 300 g/hl (3 kg/ha) Da miscelare con prodotti fitosanitari per ridurne la fitotossicità Per ispessire la buccia e aumentare la conservazione del frutto post raccolta: • MINUS Calcio 400 g/hl (4 kg/ha) Per aumentare la pezzatura: • MAIOR PLUS 300 g/hl (3 kg/ha)
1 Fogliare		Per contrastare le carenze di zinco e aiutare la pianta a contrastare gli stress ossidativi: • MINUS Rame 400 g/hl (4 kg/ha) + MINUS Zinco 200 g/hl (2 kg/ha)	