

Mirtilli

Impianti in produzione (Su suolo) - Agricoltura Convenzionale



PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

| Fase di applicazione | Modo d'uso | Intervento base | Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i> |
|---|---|---|--|
| Fine inverno | 1 Concimazione di base | Concime organico o organo-minerale | Orgazot Plus (Micro)* 150-200 kg/ha * ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL |
| Ingrossamento gemme | 2 Fertirrigazioni A distanza di 7-10 giorni circa | A. RED Radicale 10 kg/ha + BLU 10 kg/ha B. SYSTEMA 10 kg/ha | |
| | 1 Fogliare | MINUS Rame 3 kg/ha+ MINUS Zinco 2 kg/ha | |
| Rottura gemme | 1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata | | Per contrastare i danni da gelate tardive: • ICE TIME 5-6 kg/ha (Guarda la scheda sulle gelate tardive per conoscere la strategia GERMINA) |
| Fioritura | 1 Fogliare | MAIOR PLUS 3 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha | |
| | 1 Fogliare Dopo 10-15 giorni | | Per favorire l'accumulo di energie, necessarie ad incrementare la produzione: • RELIFE 1 kg/ha |
| | 1 Fertirrigazione | SYSTEMA 10 kg/ha | |
| | 1 Fertirrigazione Dopo 10-15 giorni | | Per favorire lo sviluppo radicale e migliorare l'assorbimento dei nutrienti: • RED Radicale 10 kg/ha |
| A partire dalla formazione dei frutti e fino a raccolta | 1 Fogliare | MAIOR PLUS 3 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha + MINUS Calcio 3 kg/ha | |
| | Fogliari Ripetere ogni 10-15 giorni fino a raccolta | | Per contrastare i danni dovuti a siccità e caldo anomalo: • RED 3 kg/ha Per contrastare l'effetto dello spacco e aumentare il tempo di conservazione del frutto: • MINUS Calcio 3 kg/ha Per aumentare la pezzatura: • MAIOR PLUS 3 kg/ha |
| | 2 Fertirrigazioni A distanza di 15 giorni circa | A. RED Radicale 10 kg/ha + BLU 20 kg/ha B. SYSTEMA 10 kg/ha | In funzione della produttività della pianta, eventualmente ripetere la fertirrigazione dopo 7-10 giorni |
| Periodo estivo (dopo la raccolta) | Fogliari Ripetere ogni 20 giorni nel periodo estivo | | Per contrastare i danni dovuti a siccità e caldo anomalo: • RED 3 kg/ha |
| | 1 Fogliare | MINUS Rame 4 kg/ha + MINUS Zinco 2 kg/ha | |
| Durante l'inverno | Fogliari 2 o 3 applicazioni al massimo | | Per contrastare i danni da stress ossidativo: • MINUS Rame 5 kg/ha Da applicare nelle giornate invernali più calde (oltre i 12-13 °C) |