

# Ciliegio

Impianti in produzione - Agricoltura Convenzionale



## PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i>
Fine periodo invernale	1 <b>Concimazione di base</b>	Concime organico o organo-minerale	<b>GERMINA</b> consiglia <b>Orgazot Plus (Micro)*</b> 150-200 kg/ha  * <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è il concime organico granulare consigliato da <b>GERMINA</b> per la concimazione solida di base. <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è prodotto da AGM SRL
Rigonfiamento gemme	1 <b>Fertirrigazione</b>	<b>MAIOR 0-42-50</b> 10 kg/ha + <b>RED Radicale</b> 10 kg/ha	Per stimolare lo sviluppo vegetativo: + <b>BLU</b> 10 kg/ha
	1 <b>Fogliare</b>	<b>MINUS Rame</b> 3 kg/ha+ <b>MINUS Zinco</b> 2 kg/ha	
Bottoni bianchi	1 o più <b>Fogliari</b> Da applicare prima di una gelata		Per contrastare i danni da gelate tardive: ● <b>ICE TIME</b> 5-6 kg/ha (Guarda la scheda sulle gelate tardive per conoscere la strategia <b>GERMINA</b> )
Fioritura	1 <b>Fogliare</b>	<b>MAIOR PLUS</b> 2 kg/ha + <b>RELIFE</b> 1 kg/ha	Per favorire ulteriormente l'allegagione: + <b>BETTER</b> 100 g/hl
	1 o più <b>Fogliari</b> Da applicare prima di una gelata		Per contrastare i danni da gelate tardive: ● <b>ICE TIME</b> 5-6 kg/ha
Allegagione	1 <b>Fertirrigazione</b>	<b>MAIOR 0-42-50</b> 10 kg/ha + <b>RED Radicale</b> 10 kg/ha + <b>BLU</b> 10 kg/ha	
	1 <b>Fogliare</b>	<b>MAIOR PLUS</b> 2 kg/ha	Per migliorare l'assorbimento radicale e lo stato di salute della pianta: + <b>RELIFE</b> 1 kg/ha  Per trattare le clorosi ferriche: + <b>MINUS Ferro</b> 3 kg/ha
	1 o più <b>Fogliari</b> Da applicare prima di una gelata		Per contrastare i danni da gelate tardive: ● <b>ICE TIME</b> 5-6 kg/ha
Ingrossamento frutti	1 <b>Fogliare</b>	<b>RED</b> 3 kg/ha + <b>MINUS Calcio</b> 3 kg/ha + <b>MAIOR PLUS</b> 3 kg/ha	
Dopo 7-10 giorni	<b>Fogliari</b> Ogni 7-10 giorni fino a raccolta		Per contrastare i danni dovuti a siccità e caldo anomalo: ● <b>RED</b> 3 kg/ha  Per contrastare l'effetto dello spacco e aumentare il tempo di conservazione del frutto: ● <b>MINUS Calcio</b> 3 kg/ha  Per aumentare la pezzatura: ● <b>MAIOR PLUS</b> 3 kg/ha
Periodo estivo (dopo la raccolta)	<b>Fogliari</b> Ripetere ogni 20 giorni nel periodo estivo		Per contrastare i danni dovuti a siccità e caldo anomalo: ● <b>RED</b> 3 kg/ha
	1 <b>Fogliare</b>	<b>MINUS Rame</b> 4 kg/ha + <b>MINUS Zinco</b> 2 kg/ha	
Durante l'inverno	<b>Fogliari</b> 2 o 3 applicazioni al massimo		Per contrastare i danni da stress ossidativo: ● <b>MINUS Rame</b> 5 kg/ha Da applicare nelle giornate invernali più calde (oltre i 12-13 °C)