

Ciliegio

Impianti in produzione - Agricoltura Biologica



PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

| Fase di applicazione | Modo d'uso | Intervento base | Suggerimenti <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione culturale</i> |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Fine periodo invernale | 1 Concimazione di base | Concime organico o organo-minerale | GERMINA consiglia Orgazot Plus (Micro)* 150-200 kg/ha * ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL |
| Rigonfiamento gemme | 1 Fertirrigazione | ECO RED Radicale 10 kg/ha | Per stimolare ulteriormente lo sviluppo vegetativo: + BLU 10 kg/ha |
| | 1 Fogliare | MINUS Rame 3 kg/ha+ MINUS Zinco 2 kg/ha | |
| Bottoni bianchi | 1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata | | Per contrastare i danni da gelate tardive: • ICE TIME 5-6 kg/ha (Guarda la scheda sulle gelate tardive per conoscere la strategia GERMINA) |
| Fioritura | 1 Fogliare | MAIOR NOVA 2 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha | Per favorire ulteriormente l'allegagione: + ECO RED 3 kg/ha |
| | 1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata | | Per contrastare i danni da gelate tardive: • ICE TIME 5-6 kg/ha |
| Allegagione | 1 Fertirrigazione | ECO RED Radicale 10 kg/ha + BLU 10 kg/ha | |
| | 1 Fogliare | MAIOR NOVA 4 kg/ha | Per migliorare l'assorbimento radicale e lo stato di salute della pianta: + RELIFE 1 kg/ha Per trattare le clorosi ferriche: + MINUS Ferro 3 kg/ha |
| | 1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata | | Per contrastare i danni da gelate tardive: • ICE TIME 5-6 kg/ha |
| Ingrossamento frutti | 1 Fogliare | ECO RED 3 kg/ha + MINUS Calcio 3 kg/ha + MAIOR NOVA 4 kg/ha | |
| Dopo 7-10 giorni | Fogliari Ogni 7-10 giorni fino a raccolta | | Per contrastare i danni dovuti a siccità e caldo anomalo: • ECO RED 3 kg/ha Per contrastare l'effetto dello spacco e aumentare il tempo di conservazione del frutto: • MINUS Calcio 3 kg/ha Per aumentare la pezzatura: • MAIOR NOVA 3 kg/ha |
| Periodo estivo (dopo la raccolta) | Fogliari Ripetere ogni 20 giorni nel periodo estivo | | Per contrastare i danni dovuti a siccità e caldo anomalo: • ECO RED 3 kg/ha |
| | 1 Fogliare | MINUS Rame 4 kg/ha + MINUS Zinco 2 kg/ha | |
| Durante l'inverno | Fogliari 2 o 3 applicazioni al massimo | | Per contrastare i danni da stress ossidativo: • MINUS Rame 5 kg/ha Da applicare nelle giornate invernali più calde (oltre i 12-13 °C) |