


# Pesco

Impianti in produzione - Agricoltura Biologica



## PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione culturale</i>
Ingrossamento gemme	1 Concimazione di base	Concime organico o organo-minerale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Orgazot Plus (Micro)*</b> 200-250 kg/ha</li> </ul> <p>* <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è il concime organico granulare consigliato da <b>GERMINA</b> per la concimazione solida di base. <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è prodotto da <b>AGM SRL</b></p>
	1 Fogliare	<b>MINUS Rame</b> 5 kg/ha	
	1 Fertirrigazione	<b>ECO RED Radicale</b> 15 kg/ha	Per favorire ulteriormente lo sviluppo vegetativo: + <b>BLU</b> 10 kg/ha
Fioritura	1 Fogliare	<b>MAIOR NOVA</b> 4 kg/ha + <b>RELIFE</b> 1,5 kg/ha	
	1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata		In caso di rischio gelate: • <b>ICE TIME</b> 5-6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
Scamiciatura/ Formazione frutticini	1 Fogliare	<b>MAIOR NOVA</b> 4 kg/ha + <b>RELIFE</b> 1,5 kg/ha	Per trattare una carenza di ferro: + <b>MINUS Ferro</b> 3 kg/ha
	1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata		In caso di rischio gelate: • <b>ICE TIME</b> 5-6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
Ingrossamento frutti	1 Fertirrigazione	<b>ECO RED Radicale</b> 10 kg/ha + <b>BLU</b> 10 kg/ha	
	1 Fogliare	<b>MAIOR NOVA</b> 4 kg/ha + <b>MINUS Zinco</b> 2 kg/ha	
Periodo estivo (Fino a raccolta)	1 Fogliare	<b>MAIOR NOVA</b> 4 kg/ha + <b>MINUS Calcio</b> 3 kg/ha	Per migliorare lo stato di benessere della pianta e aumentare l'assorbimento radicale: + <b>RELIFE</b> 1 kg/ha
	Fogliari Da applicare ogni 10-15 giorni fino a raccolta		Per contrastare i danni da siccità e caldo anomalo: • <b>ECO RED</b> 3 kg/ha  Per aumentare la pezzatura: • <b>MAIOR NOVA</b> 3 kg/ha  Per ispessire la buccia e aumentare la conservazione del frutto: • <b>MINUS Calcio</b> 3 kg/ha
Post-raccolta	1 Fogliare	<b>MINUS Rame</b> 3 kg/ha + <b>MINUS Zinco</b> 2 kg/ha	
Inverno	1-3 Fogliari		Per contrastare i danni da stress ossidativo: • <b>MINUS Rame</b> 5 kg/ha Da applicare nelle giornate invernali più calde (oltre i 12-13 °C)