

# MINUS Multi

PER CARENZE DI RAME E ZINCO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

- FACILMENTE ASSIMILABILE
- PREVIENE E CURA LE CARENZE DI RAME E ZINCO
- RAPIDO ASSORBIMENTO
- NON CONTIENE CHELATI O COMPLESSI CHIMICI DI SINTESI

UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO  
RICONOSCIUTO. NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE.

## Dosi per applicazione fogliare

**Melo, Pero e Pomacee in genere** - Il prodotto può essere applicato durante la stagione vegetativa alla dose di 2-4 kg/ha, mantenendo un intervallo di 10-20 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Pesco, Susino, albicocco e drupacee in genere** - Il prodotto può essere applicato durante la stagione vegetativa alla dose di 1,5-2,5 kg/ha, mantenendo un intervallo di 20-30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Actinidia (kiwi)** - A partire dal risveglio vegetativo fino alla comparsa dei bottoni, il prodotto può essere applicato alla dose di 3-5 kg/ha mantenendo un intervallo di 20 giorni circa fra un'applicazione e l'altra. **Da bottoni bianchi fino a raccolta frutti**, il prodotto può essere applicato alla dose di 1,5-2,5 kg/ha, mantenendo un intervallo di 20-30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Altre frutticole** - A partire da frutti allegati, il prodotto può essere applicato alla dose di 1,5-3 kg/ha, mantenendo un intervallo di 20-30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Ulivo** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte prima della fioritura alla dose di 3-5 kg/ha, mantenendo un intervallo di almeno 10 giorni fra un'applicazione e l'altra e dopo l'allegagione alla dose di 2-3 kg/ha, mantenendo un intervallo di 10-20 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Noce, Nocciole, Castagno** - Il prodotto può essere applicato durante la stagione vegetativa alla dose di 2-4 kg/ha, mantenendo un intervallo di 20-30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Vite** - A partire da germogli lunghi 15 cm, effettuare 2-4 applicazioni fino ad allegagione, mantenendo un intervallo compreso fra 5 e 30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Orticole da frutto** - Durante tutto lo sviluppo e la fase produttiva della

pianta, applicare il prodotto alla dose di 2-4 kg/ha (200-400 g/ha), mantenendo un intervallo di 10-20 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Orticole da foglia** - Durante tutto lo sviluppo e la fase produttiva della pianta, applicare il prodotto alla dose di 2-3 kg/ha (200-300 g/ha), mantenendo un intervallo di 10-20 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Frumento, orzo** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte da accestimento a botticella alla dose di 2-4 kg/ha. **Mais** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte con piante alte da 20 a 80 cm alla dose di 2-4 kg/ha. **Soya** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte alla dose di 2-4 kg/ha a partire da piante con 2-3 foglie vere a formazione bacelli. **Girasole** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte con piante alte da 20 a 80 cm alla dose di 2-4 kg/ha.

## Miscibilità

**Miscibilità con agrofarmaci:** solo alcuni formulati possono essere miscelati con MINUS Multi. Non miscelare con agrofarmaci senza l'approvazione del servizio tecnico **GERMINA**.

**Miscibilità con fertilizzanti:** È possibile verificare i concimi compatibili consultando l'apposita sezione del catalogo prodotti e il sito web.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda di contattare il servizio tecnico **GERMINA** facendo riferimento al proprio fornitore.

NON SUPERARE LE DOSI INDICATE. IN CASO DI DUBBI SUI DOSAGGI CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

PROD. 25.10.2024  
L. 042F0001/06-7

FLACONE	TAPPO	ETICHETTA
RACCOLTA PLASTICA		

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

## CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA

Rame (Cu) solubile in acqua 2,0 %

Zinco (Zn) solubile in acqua 4,0 %

**Componenti:** Solfato di rame, Solfato di zinco

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

## MINUS MULTI - CONTIENE SOLFATO DI RAME E SOLFATO DI ZINCO

UFI: XM30-60KV-Q00K-F320

## PERICOLO

### INDICAZIONI DI PERICOLO

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



### CONSIGLI DI PRUDENZA

P260 Non respirare i vapori. P305+P351+P338 IN CASO DI PARENTESI CON GLI OCCHI: sciacciare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacciare.

P335 IN CASO DI PARENTESI CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacciare la pelle [o fare una doccia]. P280

Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.



Peso netto

1 kg

Germina di Monduzzi Flavia, Savignano sul Panaro (MO), Via dell'Artigianato, 1A - Tel. 059 2154196

GERMINA