MINUS Rame

Bio

Modo di impiego e dosi

MINUS Rame è un prodotto molto facilmente assimilabile dalle piante sia a livello fogliare che a livello radicale, tuttavia l'applicazione radicale è consigliata solamente nelle piante coltivate su substrato, ossia in assenza di suolo.

Dosi per applicazione fogliare

Melo, Pero, e Pomacee in genere - Al risveglio vegetativo effettuare 1-2 applicazioni a 4-6 kg/ha. Da ripetere dopo la raccolta frutti. Durante l'ingrossamento frutti 1-3 kg/ha 1 o più volte in funzione del bisogno.

Albicocco e Ciliegio - Al risveglio vegetativo effettuare 1-2 applicazioni a 4-6 kg/ha. Durante ingrossamento frutti 2-4 kg/ha 1 o più volte. Dopo la raccolta frutti da 1 a 4 volte alla dose di 3-4 kg/ha.

Pesco, Mandorlo e Susino - Al risveglio vegetativo effettuare 1-2 applicazioni a 4 kg/ha. Ripetere a fine estate 1-2 volte prima della caduta delle foglie.

Uliveti - Al risveglio vegetativo effettuare 1 applicazione a 4-5 kg/ha. Durante l'ingrossamento frutti 1-3 volte a 3-4 kg/ha. A fine raccolta effettuare 2 applicazioni a 6 kg/ha.

Actinidia (Kiwi) - Al risveglio vegetativo effettuare 1-2 applicazioni a 4-6 kg/ha. Da ripetere eventualmente alla dose di 3-4 kg/ha prima della fioritura e durante l'ingrossamento frutti. Dopo la raccolta frutti 1 applicazione alla dose di 6 kg/ha.

Altre colture frutticole - Applicare 2-5 kg/ha una o più volte in funzione della necessità.

Vigneti - Al risveglio vegetativo effettuare 1-2 applicazioni a 4-6 kg/ha. Da ripetere eventualmente alla dose di 3-4 kg/ha prima della fioritura e poi prima dell'invaiatura e in prossimità della raccolta.

Orticole da frutto - Durante lo sviluppo della pianta, in funzione delle necessità, effettuare applicazioni di 2-4 kg/ha (circa 300 g/100 litri) ogni 20 giorni circa.

Aromatiche (lavanda, rosmarino, origano, maggiorana, elicriso, salvia) - Effettuare 1 o più applicazioni a 200-400 g/100 litri in funzione delle necessità mantenendole distanti almeno 10 giorni l'una dall'altra. Timo - Mantenere distanti le applicazioni almeno 20 giorni l'una dall'altra.

Basilico in vaso e in pieno campo - Effettuare applicazioni a 200-400 g/100 litri o 3-4 kg/ha ogni 10-20 giorni. Non applicare su piante che presentano problemi di stentata crescita o giallume fogliare dovuto a problemi di sviluppo dell'apparato radicale.

Floricole - Effettuare 1 o più applicazioni a 150-300 g/100 litri in funzione delle necessità mantenendo distanti le applicazioni almeno 10-20 giorni l'una dall'altra.

Dosi per fertirrigazione

Orticole, Aromatiche, Floricole (colture in vaso e fuori suolo) - Applicare 1-2 volte 0,5-1 kg/1000 litri. Mantenere le applicazioni distanti almeno 15 giorni l'una dall'altra.

Miscibilità

Miscibilità con agrofarmaci: solo alcuni formulati possono essere miscelati con **MINUS Rame**. Non miscelare con agrofarmaci senza l'approvazione del servizio tecnico **GERMINA**.

Miscibilità con fertilizzanti in applicazione fogliare: **MINUS RAME** è miscibile con **RED, MAIOR NOVA, MAIOR PLUS** e **ICE TIME**. Miscelabile solo su espressa indicazione tecnica con **ECO RED, BLU, MINUS FERRO, MINUS ZINCO** e urea (contattare il servizio tecnico **GERMINA**). Non miscelare con **SYSTEMA, RELIFE, BETTER, MINUS CALCIO,** con concimi NPK, chelati di ferro, chelati di microelementi o con altri concimi a base di rame.

Miscibilità con fertilizzanti in fertirrigazione: **MINUS RAME** è miscibile in fertirrigazione con **ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE** e **MINUS ZINCO.** E' possibile inoltre miscelarlo con urea, nitrato ammonico, solfato ammonico, nitrato di potassio, solfato di potassio, solfato di magnesio (16% MgO), nitrato di magnesio, acido nitrico, chelato di ferro e acido fosforico. Non miscelare in fertirrigazione con **RED RADICALE, BLU, MAIOR 0-42-50, ECO RED RADICALE, MINUS CALCIO,** con nitrato di calcio, MAP (18-46), urea fosfato e concimi idrolosubili ternari (NPK).

E' possibile verificare l'elenco aggiornato dei concimi compatibili consultando l'apposita sezione del catalogo prodotti e del sito web.

Per ulteriori chiarimenti si suggerisce di contattare il servizio tecnico **GERMINA**, facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di zona.

CARATTERISTICHE CHIMICHE	
Rame (Cu) totale	5,0%
Rame (Cu) solubile in acqua	5,0%
Veicolanti del rame: amminoacidi, peptidi, carboidrati e acidi organici	
Conducibilità elettrica (EC) prodotto diluito in acqua (3g/litro)	1,5 mS/cm
pH prodotto diluito in acqua (3g/litro)	4,8
Principali carboidrati presenti: Trealosio, mannosio, glucani, mannitolo.	
Principali vitamine presenti: Vitamine gruppo B, Vitamina E.	
Principali amminoacidi proteici presenti (50% in forma libera e 50% in forma di peptidi): Acido Aspartico, Acido glutammico, Alanina, Prolina, Arginina, Serina, Glicina, Treonina, Leucina, Valina, Isoleucina, Cisteina, Lisina, Metionina, Istidina, Triptofano.	
Il prodotto NON contiene fosfiti o fosfonati	
AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	

Da utilizzare in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Conservare a temperatura ambiente. In caso di fuoriuscita, lavare con acqua.

Prodotto liquido in Formati da **1 kg, 5 kg** e **20 kg**

GERMINA di Monduzzi Flavia
Via dell'Artigianato 1/A - 41056 - Savignano sul Panaro (MO)
Tel. 059215416 - info@germina-nutrition.com