


# Actinidia - Kiwi verde

Impianti in produzione - Agricoltura Biologica



## PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione culturale</i>
<b>Ingrossamento gemme</b>	1 <b>Fogliare</b>		Per il benessere delle piante: • <b>MINUS Rame</b> 6 kg/ha
<b>Rottura gemme</b>	1 <b>Concimazione di base</b>	Concime organico o organo-minerale	<b>Orgazot Plus (Micro)*</b> 200-250 kg/ha  * <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è il concime organico granulare consigliato da <b>GERMINA</b> per la concimazione solida di base. <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è prodotto da <b>AGM SRL</b>
<b>Germogli lunghi circa 10 cm</b>	1 <b>Fertirrigazione</b>	<b>ECO RED Radicale</b> 15 kg/ha	Per favorire ulteriormente lo sviluppo vegetativo: + <b>BLU</b> 10 kg/ha
	1 <b>Fogliare</b>	<b>MINUS Rame</b> 4 kg/ha + <b>MINUS Zinco</b> 2 kg/ha	
	<b>Fogliare</b> da ripetere se necessario		In caso di rischio gelate: • <b>ICE TIME</b> 5-6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
<b>Germogli lunghi circa 20-30 cm</b>	1 <b>Fogliare</b>	<b>MAIOR NOVA</b> 4 kg/ha + <b>RELIFE</b> 1,5 kg/ha	Per trattare una carenza di ferro: + <b>MINUS Ferro</b> 3 kg/ha
	1 <b>Fogliare</b>	<b>MINUS Rame</b> 4 kg/ha + <b>MINUS Zinco</b> 2 kg/ha	
	<b>Fogliare</b> da ripetere se necessario		In caso di rischio gelate: • <b>ICE TIME</b> 5-6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
<b>Prefioritura (bottoni)</b>	1 <b>Fogliare</b>	<b>MAIOR NOVA</b> 4 kg/ha + <b>RELIFE</b> 1 kg/ha	Per indurre una resistenza ad alte temperature: + <b>ECO RED</b> 1 kg/ha;
	1 <b>Fogliare</b>		Per il recupero da stress abiotici: • <b>MINUS Rame</b> 2-3 kg/ha
	1 o più <b>Fogliari</b> Da applicare prima di una gelata		In caso di rischio gelate: • <b>ICE TIME</b> 6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
	1 <b>Fertirrigazione</b>	<b>ECO RED Radicale</b> 15 kg/ha + <b>BLU</b> 20 kg/ha	
<b>Da fine fioritura a formazione frutticini</b>	1 <b>Fogliare</b>	<b>MAIOR NOVA</b> 4 kg/ha + <b>RELIFE</b> 1,5 kg/ha	
	<b>Fogliare</b> da ripetere se necessario		In caso di rischio gelate • <b>ICE TIME</b> 6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
<b>Ingrossamento frutti</b>	1 <b>Fogliare</b>	<b>MAIOR NOVA</b> 4 kg/ha	Per indurre una resistenza ad alte temperature: + <b>ECO RED</b> 2-3 kg/ha
	- <b>Dopo 10-15 giorni</b>	<b>Fogliari</b> ogni 20 giorni circa <b>MINUS Calcio</b> 3 kg/ha + <b>ECO RED</b> 3 kg/ha (ogni 20 giorni per tutto il periodo estivo)	Per favorire l'ingrossamento dei frutti: + <b>MAIOR NOVA</b> 4 kg/ha
<b>Post-raccolta</b>	1 <b>Fogliare</b> da ripetere se necessario dopo 10-20 giorni	<b>MINUS Rame</b> 6 kg/ha	
<b>Inverno</b>	<b>Nebulizzazione sul tronco</b>		Per il benessere delle piante: • <b>MINUS Rame</b> 6 kg/ha (ripetere 1-2 volte nel periodo invernale prediligendo le giornate più miti)