


Pesco

Nuovi Impianti (II° anno e anni successivi per impianti non produttivi) - Agricoltura Convenzionale



PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

| Fase di applicazione | Modo d'uso | Intervento base | Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i> |
|---|--|---|---|
| Ingrossamento gemme | 1 Concimazione di base | Concime organico o organo-minerale | ORGAZOT PLUS* 80-100 g/pianta * ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL |
| | 1 Fertirrigazione (localizzato) | RED Radicale 10 g/pianta + MAIOR 0-42-50 5 g/pianta | Se si utilizzano prodotti a base di microrganismi (micorrize, batteri, ecc.), al fine di aumentarne l'efficacia, miscelare con RED Radicale |
| | 1 Fogliare | MINUS Rame 400 g/hl + MINUS Zinco 200 g/hl (non applicare dopo l'ingrossamento gemme) | |
| Apertura foglie | 1 Fertirrigazione | RED Radicale 10 g/pianta + MAIOR 0-42-50 5 g/pianta | |
| | 1 Fogliare | | Per il migliorare il benessere della pianta e per aiutarla in caso di stress: • MINUS RAME a 300 g/hl + MINUS Zinco 200 g/hl |
| A partire da foglie aperte e per tutta la stagione vegetativa | Fogliari da alternare ogni 30-40 giorni Ripetere sequenza fino a fine sviluppo vegetativo. | A. MAIOR PLUS 300 g/hl + RED 300 g/hl | In caso di specie soggette a carenze da ferro, soprattutto se coltivate in suoli calcarei o con poca sostanza organica, si consiglia di aggiungere, all'applicazione B : + MINUS FERRO 300 g/hl |
| | | 30-40 giorni dopo l'intervento A : B. RELIFE 150 g/hl Dopo 30-40 giorni dall'intervento B ricominciare sequenza dall'intervento A . | |
| Caduta foglie | 1 Fogliare | | Per il benessere della pianta e per aiutarla in caso di stress: • MINUS RAME a 400 g/hl |
| Periodo invernale | 1 Fogliare | MINUS Rame 500 g/hl | Per contrastare i danni da stress ossidativo: • MINUS Rame 500 g/hl Da applicare nelle giornate invernali più calde (oltre i 12-13 °C) |