

Albicocco

Nuovi Impianti (II° anno e anni successivi per impianti non produttivi) - **Agricoltura Biologica**



PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i>
Ingrossamento gemme	1 Concimazione di base	Concime organico o organo-minerale	ORGAZOT PLUS* 80-100 g/pianta * ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL
	1 Fertirrigazione (localizzato)	ECO RRED Radicale 10 g/pianta	Se si utilizzano prodotti a base di microrganismi (micorrize, batteri, ecc.), al fine di aumentarne l'efficacia, miscelare con ECO RRED Radicale
	1 Fogliare	MINUS Rame 300 g/hl + MINUS Zinco 200 g/hl	
Apertura foglie	1 Fertirrigazione	ECO RED Radicale 10 g/pianta	
	1 Fogliare		Per il migliorare il benessere della pianta e per aiutarla in caso di stress: • MINUS RAME a 300 g/hl + MINUS Zinco 200 g/hl
A partire da foglie aperte e per tutta la stagione vegetativa	Fogliari da alternare ogni 20-30 giorni Ripetere sequenza fino a fine sviluppo vegetativo.	A. MAIOR NOVA 500 g/hl + RED 300 g/hl	
		20-30 giorni dopo l'intervento A : B. RELIFE 150 g/hl	In caso di specie soggette a carenze da ferro, soprattutto se coltivate in suoli calcarei o con poca sostanza organica aggiungere all'intervento B : + MINUS FERRO 300 g/hl
		20-30 giorni dopo l'intervento B : C. MINUS RAME 300 g/hl + MINUS Zinco 200 g/hl	
		Dopo 20-30 giorni dall'intervento C ricominciare sequenza dall'intervento A .	
Caduta foglie	1 Fogliare		Per il benessere della pianta e per aiutarla in caso di stress: • MINUS RAME a 500 g/hl
Periodo invernale	1-3 Fogliari		Per contrastare i danni da stress ossidativo: • MINUS Rame 5 kg/ha Da applicare nelle giornate invernali più calde (oltre i 12-13 °C)