

BETTER

FAVORISCE L'ALLEGAGIONE E LA RIPRESA DA STRESS VARI



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

- PROMOTORE DELLA RIPRODUZIONE CELLULARE
- PROMUOVE L'ALLEGAGIONE DEI FIORI
- FAVORISCE L'INDUZIONE DELLE GEMME A FIORE
- FAVORISCE L'ANTICIPO DELLA FIORITURA
- PROMUOVE LA RADICAZIONE DELLE TALEE



CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO

MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI FLUIDA

Azoto (N) organico 5%, azoto (N) totale 5,1%, carbonio (C) organico 18%, pH 4,5; sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa 30%

Componenti: pellami, proteine idrolizzate, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, alghe e prodotti a base di alghe. Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

In agricoltura biologica: non applicabile alle parti commestibili della coltura.

GERMINA

Dosi per applicazione fogliare

Pesco, susino, albicocco e ciliegio - Effettuare 1-2 applicazioni a 0,5-0,7 kg/ha a partire da piena fioritura fino a inizio cascola.

Pero e melo - Effettuare da 1 a 3 applicazioni a 0,5-0,7 kg/ha da piena fioritura a formazione frutticino.

Kiwi - Effettuare 2-3 applicazioni a 0,7-0,8 kg/ha da fine fioritura a frutticino di 10-15 mm.

Ulivo - Effettuare una singola applicazione 1 kg/ha in piena fioritura.

Vite - Effettuare 1 applicazione da piena fioritura a fine fioritura alla dose di 1 kg/ha.

Orticole da frutto - Effettuare 2 applicazioni in piena fioritura alla dose di 0,5-0,7 kg/ha (50 g/100 litri). Eventualmente ripetere 1-2 volte mantenendo 20 giorni di distanza fra ogni applicazione.

Per favorire la ripresa di fiori, frutti e piante danneggiate da gelate - Effettuare una applicazione di BETTER 1-2 giorni dopo la gelata, alla dose di 0,5-0,7 kg/ha (50-100 g/100 litri). Ripetere l'applicazione dopo 3-5 giorni.

Talee in radicazione - Effettuare una applicazione a 50-100 g/100 litri ogni 20 giorni circa.

NON SUPERARE LE DOSI INDICATE.
IN CASO DI DUBBI SUI DOSAGGI
CONTATTARE IL PROPRIO
FORNITORE.

Miscibilità

Miscibilità con agrofarmaci: Il prodotto non è miscibile con gli agrofarmaci a base di rame, zolfo, fosfati, fosfati, dodina, fosforganci e olio. Per tutti gli altri formulati la miscibilità deve essere accertata e pertanto si consiglia di effettuare una prova preliminare o di contattare il personale tecnico dell'azienda.

Miscibilità con fertilizzanti: È possibile verificare i concimi compatibili consultando l'apposita sezione del catalogo prodotti e il sito web.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda di contattare il servizio tecnico **GERMINA** facendo riferimento al proprio fornitore.

CONSERVARE IL PRODOTTO SIGILLATO
ALL'INTERNO DEL CONTENITORE ORIGINALE IN
LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, EVITANDO DI
ESPORLO AI RAGGI SOLARI

MANEGGIARE CON CURA. IN CASO DI
FUORIUSCITA DEL PRODOTTO LAVARE CON
ACQUA

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su
richiesta.

PROD. 09.04.2025
L. 002F0001/19-8

FLACCONE	TAPPO	ETICHETTA
RACCOLTA PLASTICA		

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Prodotto e confezionato da **Germina di Monduzzi Flavia**, 41056 Savignano sul Panaro (MO), Via dell'Artigianato, 1A

Peso netto

1 kg